

予防接種を受ける前にお読みください

1. 接種の方法

すべての予防接種は個別接種となります。各々の接種対象年齢の時期に、各自で予防接種受託医療機関へ必ず予約をして接種してください。

2. 接種費用……無料

定期予防接種を無料で受けるためには、次の条件を満たしていることが必要です。

- (1) 上牧町に住民登録をしていること(接種当日時点)
- (2) 受けようとする予防接種の対象者に該当していること
- (3) 予防接種受託医療機関で接種を受けること(4ページ参照)

3. 持ち物

- ・ 予診票(事前に記載事項を記入しておいてください。)
- ・ 親子健康手帳(母子健康手帳)
(接種後、接種記録を確認してください。)
- ・ 身分証明書(健康保険証や乳児医療証など)

予防接種に行く前のチェック

- 1 お子さんの体調はよいですか。
- 2 今日受ける予防接種について必要性、効果及び副反応など理解していますか。別冊子「予防接種と子どもの健康」をよく読んでわからないことがあれば、質問をメモしておきましょう。
- 3 親子健康手帳(母子健康手帳)は持ちましたか。
- 4 予診票の記入はすみしましたか。



4. 予防接種を受けることができない場合

- (1) 明らかに発熱している。(通常は37.5度を超える場合)
- (2) 重い急性疾患にかかっていることが明らかである。
- (3) それぞれのワクチンの成分(詳しくは医師にご確認ください)によってアナフィラキシー(通常接種後30分以内に出現する呼吸困難や全身性のじんましんなどを伴う重いアレルギー反応)をおこしたことがある。
- (4) その他、かかりつけの医師に予防接種を受けないほうがいいと言われている。

5. 予防接種を受ける際に注意を要する場合

以下の（１）～（４）やその他の疾病で不安な場合など、受ける場合には、かかりつけの医師のところで予防接種を受けるか、あるいは診断書または意見書をもらってから予防接種を受けるようにしてください。

- （１）心臓病、じん臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などの治療を受けている、または経過観察中である。
- （２）予防接種で、接種後２日以内に発熱のみられた場合及び発疹、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられた場合。
- （３）過去にけいれん（ひきつけ）をおこしたことがある。
※必ず、かかりつけ医に相談しましょう。
- （４）過去に免疫不全と診断された場合及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる場合。

6. 予防接種を受けた後の一般的な注意事項

- ★予防接種後、アナフィラキシー（通常接種後３０分以内に出現する汗がたくさん出る、顔が急にはれる、全身性のじんましんが出るほか、はきけ、嘔吐、声が出にくい、息苦しいなどの症状やショック状態になるようなはげしい全身反応）が現れることがありますので、接種後３０分程度は医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐ連絡がとれるようにしましょう。
- ★接種後に高熱やけいれんなどの異常があらわれた場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
- ★接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は問題ありませんが、接種部位をこすらないようにしてください。
- ★接種当日は激しい運動は避けてください。

7. 予防接種ごとの注意事項

< B型肝炎 >

- ・出生時に母子感染予防としてB型肝炎ワクチンの投与を受けたことのあるお子さんについては定期接種の対象者となりません。

< ロタウイルスワクチン >

- ・ロタウイルスワクチンは、２種類あり、２種類とも予防効果や安全性に差はありませんが、接種回数異なります。
※途中で異なるワクチンを接種することができませんので、最初に接種したワクチンを２回目以降も接種します。
- ・経口ワクチン（飲むワクチン）のため、赤ちゃんがお腹いっぱいだと、上手に飲めない場合があります。接種前60分ほど授乳を控えることをおすすめします。なお、ワクチンがうまく飲めなかったり、吐いたりしてしまった場合でも、わずかでも飲み込みが確認できていれば、ワクチンの効果に問題ありませんので、再度接種する必要はありません。
- ・接種後（特に初回接種後）１～２週間くらいの間は、「腸重積症」に注意しましょう。
（機嫌が良かったり、不機嫌になったりを繰り返す・嘔吐する・ぐったりして顔色が悪い・突然激しく泣く・血便が出る等）

< 四種混合・ヒブ・肺炎球菌 >

- ・接種を開始した月齢、年齢により規定回数が異なります。
- ・標準的な接種間隔があいた場合でも、すべてのやり直しはせず規定の回数を接種しましょう。

<BCG>

- ・接種後は、日光にあてないで、自然に乾くのを待って服を着せましょう。
 - ・接種したところをもんだり、こすったりしないようにしましょう。
 - ・BCGの経過は、接種後3～5週間後に粟粒^{あわつぶ}ぐらいの赤い膨らみができ、その先が黄身を帯びることがあります。その後、かさぶたが落ちると、後はきれいになります。赤い膨らみがあるときにもんだり、こすったりせず、その場所を清潔に保つようにしてください。
- ★接種後、コッホ現象が出現した場合、速やかに接種した医療機関に受診しましょう。

コッホ現象とは、接種後10日以内に接種局所の発赤^{ほっせき}、腫脹^{しゅちよう}及び針痕部位の化膿^{かのう}をおこすことをいいます。

8. 町内予防接種受託医療機関

医療機関名	住所	TEL (市外局番:0745)	接種可能なワクチン										
			B型肝炎	ロタリックス (1価)	ロタテック (5価)	ヒブ	肺炎球菌	四混	BCG	MR	水痘	日本脳炎	
安達内科医院	桜ヶ丘2-13-21	32-0703	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
かがや内科クリニック※1	米山台2-2-10	77-8070											○
きじ内科クリニック	片岡台2-13-15	33-7031									○		○
くずもとファミリー クリニック	葛城台3-12-22	51-3355	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○

※1 かかりつけのかたのみ。

*接種するときは医療機関に事前に必ず予約してください。

*上牧町外の奈良県内の受託医療機関でも接種できますが、持参していただく書類が必要な場合がありますので、事前に生き活き対策課へお問い合わせください。

9. その他

- ①転出後に当町の予診票を使用した場合、また、対象年齢を過ぎて受けた場合の事故の責任はとれません。また、接種費用についても全額自己負担となりますのでご注意ください。
- ②予防接種の内容は日々変更する可能性があります。広報等をご確認いただき、ご不明な点がございましたら、生き活き対策課までお問い合わせください。

〈お問い合わせ先〉

上牧町生き活き対策課
(上牧町保健福祉センター・2000年会館内)

TEL:0745-79-2020

FAX:0745-79-2021