

この予防接種予診票つづりは乳幼児期の予防接種の予診票がつづられています。
別冊子『予防接種と子どもの健康』とともに保管し、予防接種の完了に努めてください。



お子さんの予防接種の計画を立てましょう



定期予防接種

(令和5年3月現在)

◎経口生ワクチン ◇生ワクチン ◆不活化ワクチン

種類	予防する病気	対象年齢	標準的な接種年齢	回数	間隔 (標準的な接種間隔)
◆B型肝炎ワクチン	B型肝炎	生後2か月～1歳未満	生後2～9か月の間	3回	2回目：27日以上 3回目：初回接種後139日以上
◎ロタウイルス	ロタウイルス感染症	生後6週～24週	初回接種については、 生後2か月～ 生後14週6日まで	2回	27日以上
		生後6週～32週		3回	
◆ヒブワクチン	ヒブによる感染症 (細菌性髄膜炎など)	初回 生後2か月～5歳未満	生後2～7か月の間	3回※1	27日以上 (27～56日)
		追加 生後2か月～5歳未満	初回接種終了後 7～13か月の間	1回	初回接種終了後 7か月以上 (7～13か月未満)
◆小児用肺炎球菌ワクチン	肺炎球菌による感染症 (細菌性髄膜炎など)	初回 生後2か月～5歳未満	生後2～7か月の間	3回※1	27日以上
		追加 生後2か月～5歳未満	1歳～1歳3か月の間	1回	1歳以降に、初回接種終了後 60日以上
◆四種混合	ジフテリア 百日咳 破傷風 ポリオ	I期初回 生後2か月～7歳6か月未満	生後2か月～1歳の間	3回	20日以上 (20～56日)
		I期追加 生後2か月～7歳6か月未満	I期初回接種後 1歳～1歳6か月	1回	I期初回接種終了後 6か月以上 (12～18か月未満)
◇BCG	結核	1歳未満	生後5～8か月の間	1回	
◇MR (麻疹・風疹 混合ワクチン)	麻疹(はしか) 風疹(三日ばしか)	I期 1歳～2歳未満		1回	
		II期 小学校就学前の1年間 (年長児)		1回	
◇水痘 (水ぼうそう)	水痘・帯状 疱疹ウイルス の感染	初回 1歳～3歳未満	1歳～1歳3か月の間	1回	
		追加 1歳～3歳未満	初回接種終了後 6～12か月	1回	初回接種終了後 3か月以上 (6～12か月未満)
◆日本脳炎	日本脳炎	I期初回 生後6か月～7歳6か月未満	3歳	2回	6日以上 (6～28日)
		I期追加 生後6か月～7歳6か月未満	4歳	1回	I期初回接種終了後、6か月以上 (おおむね1年)
		II期 9歳～13歳未満※2	小学校4年生	1回	
◆二種混合 (DT)※2	ジフテリア 破傷風	11歳～13歳未満	小学校6年生	1回	
◆子宮頸がん 予防ワクチン	HPV16型、 18型の感染 他	小学校6年生～高校1年生の女子	中学校1年生	3回	ワクチンの種類によって接種間隔 が異なります。医師に確認してく ださい。

※1ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンについては、接種を開始した月齢・年齢により規定回数が異なります。

※2日本脳炎II期・二種混合(DT)・子宮頸がんワクチンの予診票は、対象の学年の4月に町から個別郵送されます。

●異なるワクチンの接種間隔について

