予防接種名	受けられる年齢			接種回数	
ヒブ(Hib)	生後2か月〜5歳未満 - 《初回標準接種時期》生後2〜5か月未満 ※ヒブ、小児用肺炎球菌、共通			初回···3回 追加···1回	※ヒブ・小児肺炎球菌は、それぞれ異なる接種間隔です。また、接
小児用肺炎球菌				初回・・・3回 追加・・・1回	種開始年齢によって、接種回数、 間隔が大きく異なります。
ロタウイルス	ロタリックス (1価)	生後6週~24週未満	《初回標準接種時期》 生後2か月~生後14週6日	2回	
	ロタテック (5価)	生後6週~32週未満		3回	
四種混合 (DPT-IPV) (百日咳・破傷風・ジフテリア・ポリオ)	1期	生後3か月~7歳6か月未満 《初回標準接種時期》生後3か月~1歳未満		初回···3回 追加···1回	
二種混合(ジフテリア・破傷風)	2期	11歳~13歳未満《樹	票準接種時期》小学6年生	1回	
BCG	1歳未満《初回標準接種時期》生後5~8か月未満			1回	
水痘	1歳~3歳未満《初回標準接種時期》1歳~1歳3か月未満			初回・・・1回、追加・・・1回	
麻しん風しん混合 (MR)	1期	1歳~2歳未満 《初回接種時期》1歳になったらすぐ		1回	
	2期	小学校就学前の1年間(年長児)		10	
日本脳炎※1	1期	生後6か月~7歳6か月未満 《初回標準接種時期》3歳~4歳未満		初回・・・2回、追加1回	
	2期	9歳~13歳未満 《標準接種時期》小学4年生		1回	
B型肝炎	1歳未満《初回標準接種時期》生後2~5か月未満			3回	
子宮頸がん予防	小学6年~高校1年相当《標準接種時期》中学1年			3回	

[※]各ワクチンごとの接種間隔については、冊子「予防接種と子どもの健康」や町ホームページをご参照ください。

[※]予防接種の内容は日々変更する可能性があります。必ず広報等をご確認いただき、ご不明な点などがありましたら、生き活き対策課までお問い合わせください。

^{※1・・・}日本脳炎予防接種の積極的推奨を差し控えていたことにより、受ける機会を逃した平成19年4月1日以前生まれのかたは、20歳未満までの間、定期接種として接種できます。